



Banminth

πάστα για σκύλους



1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: **Zoetis** Hellas AE, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800, ΑΜΚ: 83108/25-11-2011, Υπεύθυνος διανομέας στην Κύπρο: VitaTrace Nutrition Ltd, Στρόβολος, Κύπρος, τηλ: 22426527, ΑΑΚ: 14152

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

Pfizer Animal Health, LLN, Belgium

Δικαιούχος σήματος : Pfizer Inc, NY, USA

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Banminth, πάστα για σκύλους

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το Banminth είναι πάστα ανοικτού κίτρινου χρώματος, που περιέχει pyrantel pamoate 21,62mg ισοδύναμο με 7,5mg pyrantel βάση ανά γραμμάριο

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Banminth πάστα για σκύλους ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία παρασιτώσεων που οφείλονται σε νηματώδεις σκώληκες του γαστρεντερικού σωλήνα του σκύλου. Το Banminth είναι ιδιαίτερα δραστικό εναντίον των παρακάτω παρασίτων του σκύλου.

-*Toxocara canis*.

-*Toxascaris leonina*

-*Uncinaria stenocephala*

-*Ancylostoma caninum*

-*Ancylostoma braziliensis*

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καμία αντένδειξη δεν αναφέρεται εφ' όσον τηρούνται οι συνθήκες καλής φύλαξης και δοσολογίας.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν αναφέρονται

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το Banminth πάστα για σκύλους μπορεί να χορηγηθεί είτε απευθείας στο στόμα με την βοήθεια μιας σπάτουλας είτε μετά από ανάμειξη με την τροφή. Το Banminth χορηγείται στη δόση 2 cm πάστας ανά kg σ.β. Κάθε cm πάστας περιέχει 2,5 mg παμοϊκή πυραντέλη πάστα βάση ή 7,2 mg παμοϊκή πυραντέλη.

Κάθε σωληνάριο 24g επαρκεί για 36 kg σ.β.

Προς διευκόλυνσή σας χρησιμοποιήστε τον μετρητή πάνω στο κουτί της συσκευασίας

Δοσολογικό σχήμα

Προβείτε σε προγραμματισμένες δόσεις στις πιο κάτω φάσεις της ζωής του σκύλου.

Προληπτική αγωγή:

Κουτάβια που θηλάζουν: Πρώτη δόση σε ηλικία 2 εβδομάδων της ζωής τους και επαναλαμβάνεται κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό. Μετά από αυτό, θα πρέπει να τους χορηγείται ανά 3μηνο.

Σε κουτάβια που απομακρύνονται από την μητέρα και δεν έχει εφαρμοστεί το ανωτέρω πρόγραμμα προτείνεται η άμεση χορήγηση μιας δόσης με δύο επαναλήψεις σε μεσοδιάστημα 10 ημερών.

30329800

Όταν υπάρχει κουτάβι που προέρχεται από μια τοκετοομάδα, στην οποία δεν έχει ακολουθηθεί το πρόγραμμα ρουτίνας που προτείνεται για τα κουτάβια, συνιστάται το ακόλουθο πρόγραμμα. Μία δόση την ημέρα της άφιξης, μία την 10^η ημέρα και μία την 20^η ημέρα μετά την άφιξη. Μετά ακολουθείστε, το πρόγραμμα που ενδείκνυται για τα κουτάβια.

Θηλυκοί σκύλοι:

- Σκύλοι που εγκυμονούν: Μία δόση στο μέσο της εγκυμοσύνης (περίπου την 30^η μέρα της κυοφορίας)

- Σκύλοι σε γαλουχία: 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό και μετά κάθε 2 εβδομάδες μέχρι τον απογαλακτισμό των κουταβιών. Συστήνεται η χορήγηση στη μητέρα και τα κουτάβια που θηλάζουν να γίνεται ταυτόχρονα.

Ενήλικοι σκύλοι: από την ηλικία των 6 μηνών μία χορήγηση ανά 3 μήνες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25° C.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Καμία

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.

Αποφύγετε την επαφή του φαρμάκου με το δέρμα.

Πλύνετε καλά τα χέρια σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος που ήλθε σε επαφή με το φάρμακο.

Φυλάξτε το φάρμακο μακριά από τα παιδιά.

Το Banminth Paste για σκύλους έχει ευρύτατα περιθώρια ασφαλείας σ' όλες τις ηλικίες συμπεριλαμβανομένων μικρών σκύλων και θηλυκά σε περιόδους εγκυμοσύνης και θηλασμού. Κανονικά δοσολογικά σχήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ένα σημαντικό αντιπαρασιτικό έλεγχο.

Παρατεταμένες χορηγήσεις είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ανθεκτικά στελέχη παρασίτων έναντι της δραστικής ουσίας.

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

30329800

