

EFFIPRO®

EFFIPRO 50 MG SPOT-ON ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
FIPRONIL

■ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Virbac, 1^{ème} avenue - 2065 m - LID, 06516 Carros, FRANCE

■ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EFFIPRO 50 mg spot-on διάλυμα για γάτες Fipronil

■ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε πιπέτα των 0,5 ml περιέχει: Fipronil: 50 mg - Butylhydroxyanisole E320: 0,1 mg - Butylhydroxytoluene E321: 0,05 mg

■ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θεραπεία παρασιτώσεων από ψύλλους (*Ctenocephalides* spp.) και κροτώνων (*Dermacentor reticulatus*).

Το προϊόν εκδηλώνει διαρκή ακαριοκτόνο δράση μέχρι και 5 εβδομάδες κατά των ψύλλων (*Ctenocephalides felis*).

Το προϊόν εκδηλώνει διαρκή ακαριοκτόνο δράση μέχρι και 2 εβδομάδες κατά των κροτώνων (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*).

Εάν υπάρχουν κάποια είδη κροτώνων (*Rhipicephalus sanguineus* και *Ixodes ricinus*) όταν εφαρμόζεται το προϊόν, μπορεί να μην θανατωθούν όλα μέσα στις πρώτες 48 ώρες αλλά θα θανατωθούν μέσα σε μία εβδομάδα.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας θεραπευτικής στρατηγικής για τον έλεγχο αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους (FAD) σε περιπτώσεις όπου αυτό έχει διαγνωστεί από κτηνίατρο.

■ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Λόγω απουσίας διαθέσιμων στοιχείων, το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε γατάκια ηλικίας μικρότερα των 2 μηνών και/ή να ζυγίζονται λιγότερο από 1 kg.

■ Να μη χρησιμοποιείται σε άρρωστα ζώα (αιματοματικά νοσήματα, πυρετός...) ή υπό ανάρρωση ζώα.

■ Να μη χρησιμοποιείται σε κουνέλια, καθώς μπορεί να εκδηλωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες ή ακόμα και θάνατος.

■ Να μη χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαίσθησας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποια από τα έκδοχα.

■ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εάν το ζώο γλύκει το τρίχωμα του θα υπάρξει μια μικρή περίοδος σιελόρροιας λόγω της φύσης του φορέα.

Ανάμεσα στις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί μετά τη χρήση είναι οι παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (από φολιδωση, τοπική αλωπεκία, κνησμός, ερυθμία) και γενικός κνησμός ή αλωπεκία. Κατ' εξαίρεση, σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρικά συμπτώματα (υπερδύεση, κατάθλιψη, νευρικότητα) ή εμετός.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

■ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ: Γάτες.

■ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οδός χορήγησης και δοσολογία: Εξωτερική χρήση μόνο. Εφαρμόστε τοπικά στο δέρμα 1 πιπέτα των 0,5 ml ανά ζώο.

Τρόπος χορήγησης:

Θερμοστατικές πιπέτες:


1. Κρατήστε την πιπέτα σε κατακόρυφη θέση. Χτυπήστε ελαφρά τη στενή πλευρά της πιπέτας για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο βρίσκεται στο κυρίως μέρος της πιπέτας.

2. Σπύστε την πιπέτα κβώντας την κατά μήκος της γραμμής ένδειξης.

3. Παραμερίστε το τρίχωμα του κατοικίδιου ώσπου να φανεί το δέρμα.

4. Τοποθετήστε την άκρη της πιπέτας απευθείας στο γυμνό δέρμα και πιέστε την πιπέτα απαλά πολλές φορές ώστε να αδειάσει όλο το περιεχόμενο.

5. Επαναλάβετε τη διαδικασία σε ένα ή δύο διαφορετικά σημεία κατά μήκος της ωμοπλάτης της γάτας, κατά προτίμηση στη βάση του κεφαλού και μεταξύ των ώμων.



Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το ζώο δε μπορεί να γλύκει το μέρος εφαρμογής του προϊόντος και ότι τα ζώα δε γλύφουν το ένα το άλλο μετά την εφαρμογή. Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή για την αποφυγή υπερβολικής υγρασίας του τριχώματος με το προϊόν γιατί θα δημιουργήσει κολλώδη εμφάνιση στο τρίχωμα στο σημείο εφαρμογής. Οστόσο, σε περίπτωση που συμβεί, αυτό θα εμφανιστεί μέσα σε 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Λευκά επικαθίσματα μπορεί να γίνουν ορατά στο σημείο εφαρμογής μέχρι και 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Θεραπευτικό πρόγραμμα:

Για αποτελεσματικό έλεγχο των παρασιτώσεων των ψύλλων και/ή των κροτώνων, το θεραπευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την επιδημιολογική κατάσταση της περιοχής που εφαρμόζεται.

Λόγω έλλειψης σχετικών μελετών ασφαλείας, το ελάχιστο διάστημα μεταξύ θεραπειών είναι 4 εβδομάδες.

■ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

■ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30 °C.

Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος. Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη.

Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

■ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ψύλλοι από τα κατοικίδια εγκαθίστανται στο καλάθι του ζώου, στα στρωσίδια και στις περιοχές όπου αναπαύεται τακτικά, όπως χαλιά και έπιπλα καλυμμένα με ύφασμα. Σε αυτά θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα κατάλληλο εντομοκτόνο και να καθαρίζονται τακτικά με ηλεκτρική σκούπα, σε περίπτωση έντονης παρασιτώσης και στο ξεκίνημα εφαρμογής του προϊόντος.

Το προϊόν δεν εμποδίζει την προσβολή από κρότωνες στο ζώο. Εάν στο ζώο έχει εφαρμοστεί το προϊόν πριν από την έκθεση στους κρότωνες, οι κρότωνες θα θανατωθούν μέσα στις πρώτες 24-48 ώρες μετά από την προσκόλληση. Αυτό συνήθως συμβαίνει πριν την συμφορητική διάγκωση, μειώνοντας χωρίς να αποκλείει τον κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας. Όταν θανατωθούν οι κρότωνες πέφτουν από το τρίχωμα του ζώου αλλά αυτά που απομένουν μπορούν να απομακρυνθούν με ένα απαλό τράβηγμα.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση του λουτρού καθαριότητας στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος στις γάτες. Οστόσο, βάσει διαθέσιμων στοιχείων σε σκύλους, το λουτρό μία ώρα πριν την εφαρμογή δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των ψύλλων. Όταν χρησιμοποιείται ως μέρος της στρατηγικής θεραπείας της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους συνιστάται να χορηγείται μια φορά το μήνα στο αλλεργικό ζώο και στις υγιεινές γάτες του σπιτιού.

Για αποτελεσματικό έλεγχο κατά των προβλημάτων από τους ψύλλους σε οικία με πολλά κατοικίδια, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλο εντομοκτόνο για όλους τους σκύλους και γάτες.

■ Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τα μάτια του ζώου. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει έκθεση των οφθαλμών στο προϊόν πρέπει να ξεπλύνετε ομέσως και επιμελμένα με καθαρό νερό.

■ Να μη χρησιμοποιείται σε τραυματισμένο ή πληγμένο δέρμα

■ Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώο.

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στους βλεννογόνους και οφθαλμούς. Επομένως, η επαφή με τα μάτια ή το στόμα να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που κατά λάθος υπάρξει έκθεση των οφθαλμών στο προϊόν πρέπει να ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή και επικοινωνήστε στο γραφείο του φαρμάκου.

■ Να αποφεύγεται η επαφή του περιεχομένου με τα δάχτυλα. Εάν αυτό συμβεί, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση. Αποφύγετε τα κτηνάρια, η βρωχία και η πόση κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος. Ζώα ή χρήστες με γνωστή υπερευαίσθησας στη φητρονίλη ή τα έκδοχα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν.

■ Ζώα υπό θεραπεία δεν πρέπει να αφήνονται μέχρις ότου να στεγνώσει το τρίχωμα τους και τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτά μέχρι να στεγνώσει το τρίχωμα τους. Συνεπώς συνιστάται να μην εφαρμόζεται η θεραπεία στα ζώα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά νωρίς το απόγευμα και να μην κοιμούνται οι ιδιοκτήτες με τα υπό θεραπεία ζώα, κυρίως τα παιδιά.

■ Άλλες προφυλάξεις

Το αλκοολούχο έκδοχο μπορεί να έχει επιζήμιες επιδράσεις σε βαμμένες, λουστραρισμένες ή άλλες οικιακές επιφάνειες ή έπιπλα.

■ Χρήση κατά την κώση ή τη γαλουχία

Από εργαστηριακές μελέτες δε διαπιστώθηκαν ενδείξεις τερατογένεσης ή εμβρυοτοξικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για έγκυες ή γαλουχούσες γάτες. Να χρησιμοποιείται στην κώση ή τη γαλουχία μόνο σύμφωνα με την εκτίμηση του οφθαλμού ως προς τον κίνδυνο από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

■ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμμάτα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

■ Μη μολύνετε τον υδροφόρο ορίζοντα με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένες συσκευασίες, διότι η φητρονίλη μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στους υδράβιους οργανισμούς.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μεγέθη συσκευασίας:

Κουτιά με 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 ή 150 πιπέτες.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Virbac Hellas AE

13ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 14452, Μεταμόρφωση, Αττικής

Τηλ. 2106219520, Fax. 2108140900

info@virbac.gr, www.virbac.gr